



上海源叶生物科技有限公司
Shanghai yuanye Bio-Technology Co., Ltd
电话: 021-61312973 传真: 021-55068248
网址: www.shyuanye.com
邮箱: shyysw@sina.com

抗酸染色液(金胺 O-罗丹明荧光法)

简介:

分枝杆菌的细胞壁内含有大量脂质包围在肽聚糖的外面, 所以分枝杆菌一般不易着色, 传统的染色方法要经过加热和延长染色时间来促使其着色。分枝杆菌中的分枝菌酸与染料一旦结合后, 就很难被酸性脱色液脱色, 故名抗酸染色, 其中最具代表性是结核杆菌 Ziehl-Neelsen 染色法, 该法是 WHO 推荐热染的方法。

抗酸染色液(金胺 O-罗丹明荧光法)属于荧光染色液, 无需加热, 相对较抗酸热染液安全, 其染色原理是在室温条件下 Auramine O-罗丹明染色以及复染后, 用含有紫外光源的荧光显微镜检查, 抗酸杆菌呈亮黄色, 而其他细菌及背景中的物质呈暗黄色, 这种方法可用低倍镜检, 因此能更快速找出抗酸性菌。该试剂仅用于科研领域, 不适用于临床诊断或其他用途。

组成:

名称 \ 编号	R20686 4×100ml	R20686 4×500ml	Storage
试剂(A): 金胺 O-罗丹明染色液	100ml	500ml	RT 避光
试剂(B): 酸性脱色液	2×100ml	2×500ml	RT
试剂(C): 复染液	100ml	500ml	RT 避光
说明书	一份		

自备材料:

- 1、接种环
- 2、载玻片
- 3、蒸馏水
- 4、荧光显微镜



上海源叶生物科技有限公司
Shanghai yuanye Bio-Technology Co., Ltd
电话: 021-61312973 传真: 021-55068248
网址: www.shyuanye.com
邮箱: shyysw@sina.com

操作步骤(仅供参考):

- 1、接种环挑取待检样本，涂布于载玻片上，加热固定。
- 2、滴加金胺 O-罗丹明染色液避光染色 30min，水洗。
- 3、用酸性脱色液脱色 3min，直至涂片无黄色为止，水洗。
- 4、用复染液染色 2min，水洗。
- 5、轻轻吸干水分，自然干燥。
- 6、荧光显微镜下镜检。

染色结果:

抗酸菌	亮黄色或橘黄色
非抗酸菌、细胞、背景	暗黄色

注意事项:

- 1、每次使用后盖紧试剂瓶，以防试剂挥发和污染。
- 2、金胺 O 荧光易衰减，尽量避光操作。
- 3、上述试剂均对人体有刺激性，请注意适当防护。
- 4、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期: 12 个月有效。