



上海源叶生物科技有限公司  
Shanghai yuanye Bio-Technology Co., Ltd  
电话: 021-61312973 传真: 021-55068248  
网址: [www.shyuanye.com](http://www.shyuanye.com)  
邮箱: shyysw@sina.com

## 胰蛋白酶-EDTA 溶液(0.05%:0.02%)

### 简介:

胰蛋白酶(Trypsin)是由胰脏产生没有活性的胰蛋白酶原分泌到小肠后，小肠内的肠肽酶会活化该酶原，形成胰蛋白酶，特点在于已经活化的胰蛋白酶，能够继续活化更多胰蛋白酶原，这种过程即自动催化，胰蛋白酶在小肠工作，它会将蛋白质水解为肽，进而分解为氨基酸，其最适温度约为37℃。

源叶生物 Trypsin-EDTA Solution(0.05%:0.02%) 由 0.05% 胰蛋白酶、0.02%EDTA 等组成，不含酚红，经过滤除菌，该试剂可以直接用于培养细胞的消化，或者一些组织的消化，通常室温下 1~2min 左右就可以消化下大多数贴壁细胞。该试剂仅用于科研领域，不适用于临床诊断或其他用途。

### 组成:

名称	编号	R20105	Storage
Trypsin-EDTA Solution(0.05%:0.02%)		100ml	-20°C
说明书	②	一份	

### 自备材料:

- 1、PBS、Hanks 液或无血清培养液
- 2、显微镜
- 3、离心机

### 操作步骤(仅供参考):

- 1、贴壁细胞的消化
  - ①吸除培养液，用无菌 PBS、Hanks 液或无血清培养液洗涤细胞一次，以去除残余的血清。



上海源叶生物科技有限公司  
Shanghai yuanye Bio-Technology Co., Ltd  
电话: 021-61312973 传真: 021-55068248  
网址: [www.shyuanye.com](http://www.shyuanye.com)  
邮箱: shyysw@sina.com

②加入少量源叶生物 Trypsin-EDTA Solution, 略盖过细胞即可, 室温放置0.5~2min, 不同的细胞消化时间有所不同。

③显微镜下观察, 细胞明显收缩, 并且肉眼观察培养器皿底部发现细胞的形态发生明显的变化; 或者用枪吹打细胞发现细胞刚好可以被吹打下来, 吸除胰酶细胞消化液, 加入含血清的完全细胞培养液, 吹打下细胞, 即可直接用于后续实验。

④如果发现消化不足, 则加入 Trypsin-EDTA Solution 重新消化。

⑤如果发现细胞消化时间过长, 未及吹打细胞, 细胞已经有部分直接从培养器皿底部脱落, 直接用胰酶细胞培养液把细胞全部吹打下来, 1000~2000g离心1min, 沉淀细胞, 尽量去除胰酶细胞消化液后, 加入含血清的完全培养液重新悬浮细胞, 即可用于后续实验。

## 2、组织的消化

不同的组织需要消化的时间相差很大, 通常以消化后可以充分打散组织为宜。

### 注意事项:

- 1、尽量减少反复冻融的次数, 以免失效。④
- 2、在使用 Trypsin-EDTA Solution 过程中, 要特别注意避免消化液被细菌污染。
- 3、Trypsin-EDTA Solution 消化细胞时间不宜过长, 否则细胞铺板后生长状况会较差。
- 4、为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

**有效期:** 12个月有效。