



上海源叶生物科技有限公司
Shanghai yuanye Bio-Technology Co., Ltd
电话: 021-61312973 传真: 021-55068248
网址: www.shyuanye.com
邮箱: shyysw@sina.com

产品名称: **Bexagliflozin**
产品别名: **EGT1442; EGT0001442; THR-1442**

生物活性:				
Description	Bexagliflozin is a potent and selective SGLT2 inhibitor with IC50 value of 5.6 μ M /2 nM in SGLT1 /SGLT2 respectively. target: SGLT2 IC50: 5.6 μ M (SGLT1)/ 2 nM (SGLT2) 1) In normal rats and dogs a saturable urinary glucose excretion was produced with an ED50 of 0.38 and 0.09 mg/kg, respectively. 2) EGT1442 significantly prolonged the median survival of SHRSP rats. 3) EGT1442 dose-dependently reduced HbA1c and blood glucose concentration without affecting body mass or insulin level.			
Solvent&Solubility	In Vitro: DMSO : ≥ 100 mg/mL (215.08 mM) * ">" means soluble, but saturation unknown.			
		Solvent Mass Concentration	1 mg	5 mg
	Preparing	1 mM	2.1508 mL	10.7541 mL
	Stock Solutions	5 mM	0.4302 mL	2.1508 mL
		10 mM	0.2151 mL	1.0754 mL
	*请根据产品在不同溶剂中的溶解度选择合适的溶剂配制储备液; 一旦配成溶液, 请分装保存, 避免反复冻融造成的产品失效。 储备液的保存方式和期限: -80°C, 6 months; -20°C, 1 month。 -80°C 储存时, 请在 6 个月内使用, -20°C 储存时, 请在 1 个月内使用。			
	In Vivo: 请根据您的实验动物和给药方式选择适当的溶解方案。以下溶解方案都请先按照 In Vitro 方式配制澄清的储备液, 再依次添加助溶剂: ——为保证实验结果的可靠性, 澄清的储备液可以根据储存条件, 适当保存; 体内实验的工作液, 建议您现用现配, 当天使用; 以下溶剂前显示的百分比是指该溶剂在您配制终溶液中的体积占比; 如在配制过程中出现沉淀、析出现象, 可以通过加热和/或超声的方式助溶 1.请依序添加每种溶剂: 10% DMSO→40% PEG300 →5% Tween-80 → 45% saline Solubility: ≥ 3 mg/mL (6.45 mM); Clear solution 此方案可获得 ≥ 3 mg/mL (6.45 mM, 饱和度未知) 的澄清溶液。 以 1 mL 工作液为例, 取 100 μ L 30.0 mg/mL 的澄清 DMSO 储备液加到 400 μ L PEG300 中, 混合均匀; 向上述体系中加入 50 μ L Tween-80, 混合均匀; 然后继续加入 450 μ L 生理盐水定容至 1 mL。 2.请依序添加每种溶剂: 10% DMSO→ 90% (20% SBE- β -CD in saline) Solubility: ≥ 3 mg/mL (6.45 mM); Clear solution 此方案可获得 ≥ 3 mg/mL (6.45 mM, 饱和度未知) 的澄清溶液。 以 1 mL 工作液为例, 取 100 μ L 30.0 mg/mL 的澄清 DMSO 储备液加到 900 μ L 20% 的 SBE- β -CD 生理盐水水溶液中, 混合均匀。 3.请依序添加每种溶剂: 10% DMSO →90% corn oil Solubility: ≥ 3 mg/mL (6.45 mM); Clear solution			



上海源叶生物科技有限公司
Shanghai yuanye Bio-Technology Co., Ltd
电话: 021-61312973 传真: 021-55068248
网址: www.shyuanye.com
邮箱: shyysw@sina.com

	<p>此方案可获得 $\geq 3 \text{ mg/mL}$ (6.45 mM, 饱和度未知) 的澄清溶液, 此方案不适用于实验周期在半个月以上的实验。</p> <p>以 1 mL 工作液为例, 取 100 μL 30.0 mg/mL 的澄清 DMSO 储备液加到 900 μL 玉米油中, 混合均匀。</p>
References	<p>[1]. Zhang W et al. EGT1442, a potent and selective SGLT2 inhibitor, attenuates blood glucose and HbA(1c) levels in db/db mice and prolongs the survival of stroke-prone rats. Pharmacol Res. 2011 Apr;63(4):284-93.</p>



源叶生物