



上海源叶生物科技有限公司  
Shanghai yuanye Bio-Technology Co., Ltd  
电话: 021-61312973 传真: 021-55068248  
网址: [www.shyuanye.com](http://www.shyuanye.com)  
邮箱: [shyysw@sina.com](mailto:shyysw@sina.com)

产品名称: **SRT3109**  
产品别名: **SRT3109**

生物活性:				
Description	SRT3109 is an antagonist of CXCR2, with a $pIC_{50}$ of 8.2, and used in the research of chemokine mediated diseases.			
IC <sub>50</sub> & Target	CXCR2			
	8.2 ( $pIC_{50}$ )			
In Vitro	SRT3109 (Example 1) is an antagonist of CXCR2, with a $pIC_{50}$ of 8.2, and used in the research of chemokine mediated diseases[1].			
Solvent&Solubility	<b>In Vitro:</b> <b>DMSO : <math>\geq 100</math> mg/mL (210.29 mM)</b>  * "≥" means soluble, but saturation unknown.			
		<div>Solvent / Mass / Concentration</div>	1 mg	5 mg
	Preparing	1 mM	2.1029 mL	10.5146 mL
	Stock Solutions	5 mM	0.4206 mL	2.1029 mL
		10 mM	0.2103 mL	1.0515 mL
	*请根据产品在不同溶剂中的溶解度选择合适的溶剂配制储备液。一旦配成溶液, 请分装保存, 避免反复冻融造成的产品失效。 储备液的保存方式和期限: -80°C, 6 months; -20°C, 1 month。-80°C 储存时, 请在 6 个月内使用, -20°C 储存时, 请在 1 个月内使用。			
	<b>In Vivo:</b> 请根据您的实验动物和给药方式选择适当的溶解方案。以下溶解方案都请先按照 In Vitro 方式配制澄清的储备液, 再依次添加助溶剂:  ——为保证实验结果的可靠性, 澄清的储备液可以根据储存条件, 适当保存; 体内实验的工作液, 建议您现用现配, 当天使用; 以下溶剂前显示的百分比是指该溶剂在您配制终溶液中的体积占比; 如在配制过程中出现沉淀、析出现象, 可以通过加热和/或超声的方式助溶 1.请依序添加每种溶剂: 10% DMSO→40% PEG300 →5% Tween-80 → 45% saline Solubility: $\geq 2.75$ mg/mL (5.78 mM); Clear solution 此方案可获得 $\geq 2.75$ mg/mL (5.78 mM, 饱和度未知) 的澄清溶液。 以 1 mL 工作液为例, 取 100 $\mu$ L 27.5 mg/mL 的澄清 DMSO 储备液加到 400 $\mu$ L PEG300 中, 混合均匀, 向上述体系中加入 50 $\mu$ L Tween-80, 混合均匀; 然后继续加入 450 $\mu$ L 生理盐水定容至 1 mL。  2.请依序添加每种溶剂: 10% DMSO→ 90% (20% SBE- $\beta$ -CD in saline) Solubility: $\geq 2.75$ mg/mL (5.78 mM); Clear solution 此方案可获得 $\geq 2.75$ mg/mL (5.78 mM, 饱和度未知) 的澄清溶液。 以 1 mL 工作液为例, 取 100 $\mu$ L 27.5 mg/mL 的澄清 DMSO 储备液加到 900 $\mu$ L 20% 的 SBE- $\beta$ -CD 生理盐水水溶液中, 混合均匀。  3.请依序添加每种溶剂: 10% DMSO →90% corn oil			



上海源叶生物科技有限公司  
Shanghai yuanye Bio-Technology Co., Ltd  
电话: 021-61312973 传真: 021-55068248  
网址: [www.shyuanye.com](http://www.shyuanye.com)  
邮箱: [shyysw@sina.com](mailto:shyysw@sina.com)

	<p>Solubility: <math>\geq 2.75</math> mg/mL (5.78 mM); Clear solution</p> <p>此方案可获得 <math>\geq 2.75</math> mg/mL (5.78 mM, 饱和度未知) 的澄清溶液, 此方案不适用于实验周期在半个月以上的实验。</p> <p>以 1 mL 工作液为例, 取 100 <math>\mu</math>L 27.5 mg/mL 的澄清 DMSO 储备液加到 900 <math>\mu</math>L 玉米油中, 混合均匀。</p>
References	<p>[1]. Premji Meghani, et al. Pyrimidyl sulfonamide derivative and its use for the treatment of chemokine mediated diseases. WO2010007427A1</p>



源叶生物